Prolivet®

Mantenimiento de la función hepática en perros y gatos

Oxomet® · Silibina · Fosfatidilcolina · Vitamina E

Presentación:
En estuches de 30 comprimidos palatables

Composición:

Cada comprimido de Prolivet® gatos y perros pequeños contiene:

- Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de *S.cerevisiae*.....210 mg
- Antioxidante: Vitamina E (alfa tocoferol 50%, 3a700).....21,9 mg
- Saborizante: Siliphos® (Silybum Marianum, fosfatidilcolina (lecitina)).....35 mg

Cada comprimido de Prolivet® perros grandes contiene:

- Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de *S.cerevisiae*:....1.008 mg
- Antioxidante: Vitamina E (alfa tocoferol 50%, 3a700).....105 mg
- Saborizante: Siliphos® (Silybum Marianum, fosfatidilcolina (lecitina))..168 mg

Cada comprimido de Prolivet® perros medianos contiene:

- Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de *S.cerevisiae*.....504 mg
- Antioxidante: Vitamina E (alfa tocoferol 50%, 3a700).....52,56 mg
- Saborizante: Siliphos® (Silybum Marianum, fosfatidilcolina (lecitina))..84 mg

Condiciones de almacenamiento:

Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

Descripción:

PROLIVET® es un alimento complementario para perros y gatos que contribuye a mantener la funcionalidad hepática.

La silibina es el componente más abundante y activo de la silimarina, un extracto del fruto del cardo mariano (Silybum marianum). La Silibina neutraliza los radicales libres, protegiendo así a las células hepáticas contra el daño oxidativo. También inhibe la adhesión de toxinas, así como la producción de leucotrienos, que están involucrados en la respuesta inflamatoria. Por su parte, la fosfatidilcolina es el principal precursor/metabolito de la colina, y el principal constituyente de lipoproteínas del torrente sanguíneo y membranas celulares. También es el principal componente de la bilis, y juega un papel fundamental en la transformación energética mitocondrial y en la eliminación de residuos procedentes del metabolismo celular.

Uso recomendado:

- Producto para el mantenimiento de la función hepática en perros y gatos.

Posología y forma de administración:

Se recomienda administrar los comprimidos en ayunas, al menos una hora antes de la comida, para asegurar una absorción óptima. El animal deberá tener acceso permanente al agua. Administrar **PROLIVET®** vía oral durante un mínimo de 30 días.

En casos necesarios, se puede doblar la cantidad recomendada los primeros 15 días

Peso animal	Comprimidos diarios
<6 kg	1 comprimido Prolivet® Gatos y Perros pequeños
7-15 kg	1 comprimido Prolivet® Perros medianos
16-30 kg	1 comprimido Prolivet® Perros grandes
31-50 kg	2 comprimidos Prolivet® Perros grandes
>50 kg	3 comprimidos Prolivet® Perros grandes

Área Medicina Interna e Inmunología